

# حقایقی در مورد افتادن



## برخاستن بدون خطر



اگر افتادید، تا حد امکان آرام بمانید و برای آرامش خود نفس عمیق بکشید. چند لحظه بی حرکت روی زمین بمانید و دقت کنید که آیا صدمه دیده‌اید. برخاستن به سرعت یا با شیوه‌ای نادرست می‌تواند موجب اسیب شود.

### اگر فکر می‌کنید می‌توانید بدون کمک برخیزید:

1. به پهلو غلت بزنید. تا تنظیم شدن بدن و فشار خونتان به خود استراحت دهید.

2. زانوهای خود را به سمت بدنتان بکشید و دست خود را جلوی قفسه سینه روی زمین قرار دهید.

3. خود را با فشار به حالت "میز" قرار دهید.

4. به سمت کانپه یا صندلی بخزید. هر دو دست خود را روی صندلی قرار داده و به آرامی خود را به سمت بالا بکشید. اگر احساس کردید یکی از زانوهایتان قوی‌تر است، در حالیکه هر دو دست خود را روی صندلی قرار داده‌اید و خود را به سمت بالا می‌کشید، آن زانو را خم کنید و وزن خود را روی آن بیندازید. به آرامی بچرخید و روی صندلی بنشینید.

اگر صدمه دیده‌اید و نمی‌توانید به تنها یکی برخیزید، از کسی کمک بخواهید یا با ۹۱۱ تماس بگیرید. هرراه داشتن یک تلفن همراه یا تلفن سیار همراه خود هنگام تحرک در خانه، در صورتی که تنها زندگی می‌کنید یا به کمک نیاز دارید، می‌تواند تماس تلفنی با افراد را آسان‌تر کند. گزینه دیگر، سیستم واکنش فوری است که به شما امکان می‌دهد برای درخواست کمک دکمه‌ای روی گردن‌بند یا دستبند خاصی را فشار دهید.

## تمرین برخاستن از صندلی

انجام منظم تمرینات قادری، تعادلی و انعطاف‌پذیری می‌تواند خطر افتادن شما را کاهش دهد.

1. به سمت جلوی یک صندلی که محکم است، بنشینید و زانوهای خود را کنید. خم کنید و پاها را صاف روی زمین قرار داده و به عرض شانه باز کنید.

2. ستان خود را در دو طرف خود قرار دهید، کمر و گردن خود را صاف و قفسه سینه را کمی به سمت جلو نگه دارید.

3. به آرامی نفس بگیرید. به جلو خم شوید و وزن خود را روی جلوی پاهایتان احساس کنید.

4. نفس خود را بیرون دهید، و به آرامی بایستید، تا حد امکان کمتر از ستان خود استفاده کنید.

5. برای دم و باز دمی کامل توقف کنید.

6. در حالیکه به آرامی می‌نشینید نفس بگیرید.

7. نفس خود را بیرون دهید.

8. این تمرین را ۱۰-۱۵ مرتبه تکرار کنید. اگر این تعداد بسیار زیاد است، به مرور زمان به این عدد برسید.

- سالانه از هر 4 سالمند (۶۵ سال به بالا)، 1 نفر زمین می‌خورد

- شصت درصد از افتادن‌ها در خانه رخ می‌دهد
- افتادن علت شماره یک پذیرش در خانه سالمدان است

### عوامل خطر زمین خوردن عبارتند از:

- سن +۸۵:
- تنها زندگی کردن
- اختلال در شنوایی و بینایی
- تغذیه نامناسب و کم تحرک
- سابقه افتادن

## چه کاری می‌توان انجام داد؟


بیشتر افتادن‌ها قابل پیشگیری هستند! در اینجا راههایی برای کاهش خطر عنوان شده‌اند:

فعالیت جسمانی داشته باشید

- از ارائه‌دهنده‌ی مراقبت بهداشتی خود بخواهید که داروهای شما را بررسی کند

- بیماری‌های مزمن خود را مدیریت کنید
- بینایی و شنوایی خود را سالانه کنترل کنید

- تغییرات لازم را در خانه ایجاد کنید
- در مورد افتادن و اگر ترس از افتادن دارید با ارائه‌دهنده‌ی مراقبت بهداشتی خود صحبت کنید



\*از آنجایی که ممکن است این تمرین برای همه افراد مناسب نباشد، آن را با ارائه‌دهنده‌ی مراقبت بهداشتی خود بررسی کنید

## پرسش‌هایی برای ارائه‌دهنده‌ی مراقبت بهداشتی شما

3. آیا وضعیت سلامت کنونی من چگونه می‌تواند بر خطر افتادن من تأثیر بگذارد؟ ارائه‌دهنده‌ی مراقبت‌های بهداشتی شما می‌تواند معاينه‌ای فیزیکی برای ارزیابی وضعیت عملکردی، عصبی، بینایی، قلبی و سلامت روانی شما را انجام دهد تا مشخص کند که آیا شما در معرض خطر افزایشی افتادن قرار دارید. در صورت لزوم درخواست ارجاع کنید. مراجعته به ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی متخصص در بینایی، فیزیوتراپی یا کار درمانی می‌تواند برای شما سودمند باشد.

4. آیا فعالیت جسمانی می‌تواند خطر افتادن مرا کاهش دهد؟ داشتن فعالیت جسمانی یکی از مهمترین راههای کاهش خطر افتادن شما است. فعالیت جسمانی می‌تواند قدرت، تعادل، انعطاف‌پذیری و توده استخوانی شمارا بهبود بخشد. "تای چی" و A Matter of Balance دو برنامه‌ای هستند که تأثیرشان در کاهش افتادن و افزایش سطوح فعالیت در سالمدان ثابت شده است.

1. آیا ممکن است داروهای من در افتادن من نقشی داشته باشند؟ از ارائه‌دهنده‌ی مراقبت بهداشتی خود بخواهید که تمام داروهای و مکمل‌های فعلی شما را بررسی کند. در مورد عوارض جانبی یا تداخلات احتمالی ناشی از ترکیب داروهای بپرسید.

2. آیا لازم است مکمل‌های غذایی مصرف کنم؟ پیش از آغاز هر گونه دارو، از جمله مکمل‌های، با ارائه‌دهنده‌ی مراقبت بهداشتی خود صحبت کنید. ممکن است افزایش میزان ویتامین‌ها و مواد معدنی در رژیم غذایی برایتان سودمند باشد.

صرف بسیار کم ممکن است موجب ضعف عضلانی، کاهش توده استخوانی و کاهش عملکرد عصبی شود که می‌تواند خطر افتادن شما را افزایش دهد. فهرستی از داروهای را افزایش دهد. فهرستی از داروهای را بپوش کنید. این فهرست می‌باشد. شامل تمام داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، و مکمل‌ها باشد.

# استقلال خود را حفظ کرده و از آن حفاظت کنید



## راهنمای پیشگیری از افتادن

آژانس بهداشت و خدمات انسانی شهرستان سن دیگو، سازمان خدمات سالمندی و استقلال برای اطلاعات بیشتر، با شماره (858) 5500-495 تماس بگیرید یا به سایت زیر مراجعه کنید:

[www.SanDiegoFallPrevention.org](http://www.SanDiegoFallPrevention.org)



## فهرست کنترل ایمنی در منزل

### کف زمین

- مسیرها عاری از مبلمان و به هم ریختگی باشند
- سیم‌ها و کابل‌ها را به صورت مارپیچ به دیوار متصل کرده یا بچسبانید
- با استفاده از چسب دو طرفه قالیچه‌ها و فرش‌ها را به زمین محکم کنید (یا آنها را بردارید)
- از واکسن کف استفاده نکنید
- صندلی‌هایی که ارتفاع کمی دارند و نشستن روی آنها و برخاستن از آنها دشوار است را کنار بگذارید

### پله‌ها و پلکان‌ها

- سایل را از پله‌ها دور نگه دارید
- پله‌های شکسته یا ناهموار را تعمیر کنید
- نرددهای شل را تعمیر کنید، یا نرددهای جدیدی در هر دو طرف پلکان قرار دهید
- در بالا و پائین پله‌ها یک چراغ سقفی و کلید روشنایی نصب کنید
- در پائین و بالای پله‌ها نوار‌های بازتابنده نور قرار دهید

### حمام و دستشویی

- وسایلی که اغلب از آنها استفاده می‌کنید را در قفسه‌های پائین‌تر (در ارتفاع کمر) نگه دارید
- برای شرایط اضطراری، فهرست فعلی اطلاعات بهداشتی خود یا Vial of Life را روی یخچال خود نگه دارید
- هرگز از صندلی به عنوان چهارپایه استفاده نکنید
- در کف وان یا زیر دوش پادری لاستیکی ضد لغزش قرار دهید
- در کنار و داخل وان، و در کنار توالت، دستگیرهای کمکی نصب کنید
- استفاده از صندلی توالت بالا آمده، صندلی حمام پشتی‌دار و نرم، و یا سر دوش دستی را در نظر بگیرید.

### فضای بیرونی

- ترک‌ها و شکاف‌های موجود در پیاده‌رو یا مسیر ورودی منزل را تعمیر کنید
- در خرچه‌های موجود در امتداد مسیرها تا درب ورود را هرس کنید
- ارتفاع تخت را در وضعیت راحتی قرار دهید

### اتاق خواب