

# Vắc-xin Phòng Ngừa Virus Hô Hấp



Vắc-xin giúp giảm nguy cơ trở bệnh nặng do mắc COVID-19, cúm hoặc RSV. Hãy thảo luận với bác sĩ của quý vị về loại vắc-xin phù hợp với quý vị, hoặc đi thăm khám [MyTurn.ca.gov](https://www.myturn.ca.gov).

## VẮC-XIN

## AI

## LÀM GÌ

## KHI NÀO

### COVID-19



- Tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên

- Vắc-xin COVID-19 tăng cường năm 2024-2025

- Hàng năm
- Phải đợi ít nhất 2 tháng kể từ khi chích liều trước

### BỆNH CÚM (Cúm)



- Tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên

- Vắc-xin cúm tăng cường năm 2024-2025

- Mỗi mùa cúm
- Bắt đầu từ Tháng Chín tới Tháng Mười, và tiếp tục trong suốt mùa cúm

### RSV



- Người cao niên từ 60 tuổi trở lên

- Người mang thai chưa chích vắc-xin RSV trong lần mang thai trước

- Chỉ 1 liều

- Chỉ 1 liều để chuyển bảo vệ sang trẻ sơ sinh trong 6 tháng đầu đời

- Có quanh năm, nhưng được khuyến nghị chích vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu
- Hiện không có vắc-xin thường niên
- Nếu mang thai 32-36 tuần trong các tháng từ Tháng Chín đến Tháng Một

### RSV (Kháng thể Đơn dòng)



- Trẻ sơ sinh từ 8 tháng tuổi trở xuống và các bà mẹ chưa chích vắc-xin RSV trong thời gian mang thai, hoặc
- Trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc bệnh cao từ 8-19 tháng tuổi

- 1 liều
- Đây không phải là vắc-xin, nó cung cấp kháng thể để bảo vệ khỏi mắc bệnh

- Trong, hoặc khi vào, mùa RSV (Từ Tháng Mười tới Tháng Ba)