

# A형 간염 바이러스 감염

A형 간염은 A형 간염 바이러스로 인해 발생하는 전염성이 매우 높은 단기 간 질환입니다.

## A형 간염은 어떻게 전파되니까?

A형 간염은 A형 간염에 걸린 사람의 혈액과 대변에서 발견됩니다. A형 간염 바이러스를 갖고 있는 사람이 화장실을 사용한 후 손을 씻지 않으면 이 사람이 만진 물건들에 세균이 전파될 수 있습니다.



A형 간염에 걸린 사람의 물건 만지기 또는 음식 먹기.



A형 간염에 걸린 사람과의 밀접 접촉. 여기에는 성행위, 돌보기, 약물 사용 시 이용하는 물건 함께 쓰기(바늘, 파이프), 기구 함께 쓰기 등이 포함됩니다.

## 징후 및 증상

A형 간염에 걸린 사람이 모두 증상을 보이는 것은 아닙니다. 증상이 발생할 경우, 보통 감염 후 2-7주 후에 나타납니다. 증상에는 다음이 포함됩니다.

- 황달(피부나 눈이 노란색을 띠)
- 식욕 부진(음식을 먹고 싶은 생각이 없어짐)
- 배탈/복통
- 구토
- 짙은 소변 또는 연한 색의 대변
- 설사
- 관절통
- 피로



## 예방



A형 간염을 예방하는 가장 좋은 방법은 백신 접종입니다. 6개월 간격을 두고 2회 접종할 경우 예방 능력이 가장 좋습니다. 바이러스에 노출된 후에도 백신을 접종할 수 있습니다.



화장실을 사용하거나 기저귀를 간 후, 음식을 준비하거나 먹기 전 비누와 물로 20초 이상 손을 씻으십시오.

자세한 정보와 자료는 [www.sdepi.org](http://www.sdepi.org)를 방문하여 확인해주시십시오.

