

甲型肝炎病毒感染

甲型肝炎是由甲型肝炎病毒引起的一種高傳染性短期肝臟感染。

如何傳播？

一般通過檢測甲型肝炎患者的血液和糞便發現甲型肝炎。如果感染甲型肝炎病毒的人員如廁後沒有洗手，病毒會留在其所接觸的物體上。



觸摸或進食甲型肝炎患者經手的物品或食物



與甲型肝炎患者存在密切個人接觸，包括性生活、看護或者共用吸毒用品（針頭、菸斗）或餐具。

體徵和症狀

並非每名甲型肝炎患者都會出現症狀。

如果有症狀，通常是在感染2-7周後出現。症狀包括：

- 黃疸(皮膚或眼睛發黃)
- 食慾不振(不想吃飯)
- 胃部不適/胃痛
- 嘔吐
- 尿色深黃或者大便顏色變淺
- 腹瀉
- 關節疼痛
- 感覺疲乏



預防



接種疫苗是預防甲型肝炎的最佳方法。間隔6個月接種2劑疫苗可達到最佳預防效果。即使接觸過病毒，您仍然可以接種疫苗。



如廁、換尿布之後，以及準備或進食食物之前，請用肥皂和水清洗雙手至少20秒。

如需更多資訊和資源，請訪問網站www.sdepi.org。



2023年2月15日