

¿Está por viajar al extranjero?



Protéjase contra el sarampión



Antes de viajar al extranjero, asegúrese de estar al día con sus vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

BEBÉS DE ENTRE 6 Y 11 MESES



Reciba una dosis temprana entre los 6 y 11 meses. Siga el cronograma recomendado y reciba otra dosis a los 12-15 meses y una dosis final a los 4-6 años.

NIÑOS MAYORES DE 12 MESES sin pruebas de inmunidad*



Reciba la primera dosis inmediatamente. Reciba la segunda dosis 28 días después de la primera dosis.

ADOLESCENTES Y ADULTOS sin pruebas de inmunidad*



Reciba la primera dosis inmediatamente. Reciba la segunda dosis 28 días después de la primera dosis.

* Entre las pruebas de inmunidad se incluyen las siguientes: documentación escrita de vacunación adecuada, prueba de inmunidad de laboratorio, confirmación de sarampión por laboratorio, nacimiento en Estados Unidos antes de 1957.

Planifique estar completamente vacunado contra el sarampión al menos **2 SEMANAS** antes de viajar. Si faltan menos de 2 semanas para su viaje, aún debe recibir una dosis de la vacuna MMR.



LIVE WELL
SAN DIEGO

Para obtener más información,
visite sandiegocounty.gov/measles

