

برنامه پیشگیری از هپاتیت بی قبل از زایمان در شهرستان سن دیگو (PHPP) با هدف جلوگیری از انتقال عفونت ویروس هپاتیت بی قبل از زایمان یا از مادر به نوزاد، به مادران، خانواده ها و فراهم کنندگان پزشکی محلی خدمات مدیریت پرونده و پشتیبانی ارائه می کند.

در طول بارداری شما:



- ارائه کننده شما آزمایشاتی را برای تست هپاتیت بی از شما سفارش خواهد داد
- ♦ توصیه می شود که در هر نوبت بارداری برای هپاتیت بی تست شوید، حتی اگر در بارداری قبلی تست شده اید
- اگر متوجه شویم که خانمی به بیماری هپاتیت بی مبتلا شده و باردار است، او را در برنامه رایگان خود راجستر خواهیم کرد

بعد از ثبت نام در برنامه ما، چه انتظاراتی می توانید داشته باشید:

- یک تماس تلفنی از یکی از مدیران پرونده پرستار ما
- ♦ اولین تماس تلفنی: جمع آوری اطلاعات درباره تماس های شما، ارائه دهنده گان شما، و فراهم کردن آموزش درباره هپاتیت بی /برنامه ما
- ♦ بعد از اولین تماس: یک نامه معرفی حاوی منابع بیشتر و کارت کاری مدیر پرونده پرستار شما برای شما ارسال خواهد شد

- ♦ مدیر پرونده پرستار شما با بیمارستان محل زایمان شما و ارائه دهنده مراقبت قبل از زایمان شما همکاری خواهد کرد تا مطمئن شود تیم پزشکی شما از وضعیت هپاتیت بی شما آگاه بوده و آماده ارائه واکسن های مناسب به نوزاد شما در زمان تولد است
- همچنین توصیه می کنیم با پزشک مراقبت های اولیه خود تماس بگیرید تا بدانید آیا توصیه می کند برای ارزیابی و/یا درمان بیشتر بهتر است به متخصص مراجعه کنید یا خیر

بعد از تولد نوزاد شما:

- نوزاد شما واکسن هپاتیت بی و ایمنی گلوبولین هپاتیت بی (HBIG) را در زمان تولد دریافت خواهد کرد
- ♦ هر دوی این واکسن ها باید ظرف مدت 12 ساعت از زمان تولد، در قسمت های جداگانه تزریق شوند
- ♦ هم واکسن و هم HBIG هر دو برای کمک به محافظت از نوزاد شما در برابر هپاتیت بی مورد نیازند
- سپس نوزاد شما یک سریواکسن هپاتیت بی 3 یا 4 دوزه را از طریق متخصص اطفال خود تکمیل خواهد کرد
- تست سرولوژی بعد از واکسن (PVST) توسط متخصص اطفال فرزند شما بعد از تزریق تعداد کافی از دوزهای واکسن در زمان های مناسب به فرزند شما سفارش داده خواهد شد
- ♦ PVST یک آزمایش خون شامل دو تست آزمایشگاهی است: آنتی ژن سطحی هپاتیت بی (HBsAg) و آنتی بادی سطحی هپاتیت بی (anti-HBs)
- ♦ این آزمایشات به ما می گویند که فرزند شما علیه هپاتیت بی محافظت شده و مبتلا به این بیماری نیست
- ♦ اگر فرزند شما از محافظت کافی برخوردار نباشد، ممکن است ارائه دهنده شما ناچار به واکسیناسیون دوباره فرزند شما با دوزهای بیشتر و تکرار آزمایشات شود