

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Preguntas más Frecuentes

¿Qué es el VPH?

El VPH es un virus muy contagioso que causa cáncer, lesiones cutáneas y verrugas genitales. Alrededor de 13 millones de personas se infectan con el VPH cada año.

¿Cómo se contagia el VPH?

El VPH se transmite a través del contacto íntimo piel con piel con una persona infectada. Una persona puede transmitir el virus a otra aunque no presente síntomas o no sea consciente de que tiene el virus. La vacuna contra el VPH proporciona protección mucho antes de tener contacto con el virus y puede prevenir casi todos los cánceres causados por la infección por el VPH. La vacunación contra el VPH es prevención del cáncer.

¿Es segura la vacuna contra el VPH?

Sí, la vacuna Gardasil 9 es segura y eficaz. La seguridad de Gardasil 9 ha sido analizada en más de 160 estudios y está aprobada por Food and Drug Administration (FDA).

¿Cuántas dosis hay de la vacuna?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan empezar la serie Gardasil a los 11-12 años, pero se aconseja empezar temprano, ya a los 9 años. Los adolescentes que comienzan la serie de vacunas contra el VPH a partir de los 15 años necesitan 3 dosis, administradas a lo largo de 6 meses. Si su hijo adolescente aún no está vacunado, hable con su médico sobre Gardasil 9 lo antes posible.

¿Y si mi hijo adolescente lleva retraso en la vacunación?

Si su hijo adolescente aún no está vacunado, hable con su médico para que lo haga cuanto antes. Puede aprovechar cualquiera de las visitas al médico de su hijo para que le ponga las vacunas y le haga los exámenes físicos recomendados. Escanee el código QR en la parte inferior de la página siguiente para obtener más información.



**CONÉCTESE CON UNA ENFERMERA DEL SERVICIO DE
SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN DIEGO. PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN**

LLAME AL: 1 (866) 358-2966 OPCIÓN 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV





¿Qué eficacia tiene la vacuna?

La vacuna funciona muy bien y es eficaz para prevenir el VPH. La vacuna puede prevenir los cánceres relacionados con el VPH hasta en un 90%.

¿Tiene efectos secundarios??

Como ocurre con cualquier vacuna, puede haber efectos secundarios, pero los beneficios de la vacuna superan con creces los posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes son leves e incluyen: dolor y enrojecimiento en el brazo donde se administró la vacuna, dolor de cabeza, náuseas, mareos o desmayos. Para evitar desmayos, el paciente debe estar sentado o tumbado durante la vacunación y 15 minutos después.

¿Qué debo esperar en la consulta del médico?

La vacuna se coloca en la parte superior del brazo. Puede sentir alguna molestia o una sensación de pellizco. Después de recibir la vacuna, se le pedirá que permanezca sentado durante unos 15 minutos para ser observado por una enfermera. El brazo puede estar enrojecido en el lugar de la inyección y sensible durante unos días después de recibir la vacuna.



Para obtener más información visite:
sdcounty.org

**ESCANEAR
AQUÍ!**



CONÉCTESE CON UNA ENFERMERA DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN DIEGO. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

LLAME AL: 1 (866) 358-2966 OPCIÓN 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV

