



Virus del Papiloma Humano (VPH) y Cáncer



El VPH es tan común que casi el **85%** de las personas contraerán el virus a menos que se vacunen.



El cáncer relacionado con el VPH más frecuente en los hombres jóvenes es el **cáncer de garganta**.



El VPH es la causa **#1 de cáncer de cuello uterino** en las mujeres.



La vacunación podría evitar que se desarrollen más del **90% de los cánceres causados por el VPH**.

VACUNACIÓN DE RUTINA:

Entre 11-15 años de edad, puede comenzar a partir de los 9 años



2 dosis de vacuna con un intervalo de 6-12 meses

VACUNACIÓN DE ACTUALIZACIÓN:

Entre 15-26 años de edad, si no se ha vacunado aún.



3 dosis de vacuna con un intervalo de 6-12 meses

La Prevención es la llave

Debido a lo común que es el VPH, es difícil prevenirlo sin vacunarse. La serie Gardasil 9 puede empezar a administrarse a partir de los 9 años y puede prevenir hasta el 90% de los cánceres relacionados con el VPH.



CONNECT WITH A COUNTY OF SAN DIEGO PUBLIC HEALTH NURSE FOR MORE INFORMATION

CALL: 1 (866) 358-2966 OPTION 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV

