

Diphtheria, Tetanus, & Pertussis

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Q: What is it?**

A: Diphtheria, tetanus, and pertussis can be serious bacterial diseases. These diseases can be safely prevented in children with DTaP and Tdap vaccines.

Q: Can a child that already had pertussis get it again?

A: Getting pertussis twice is uncommon but can occur. It may look like a cough that won't go away rather than severe illness.

Q: How are the vaccines that prevent these diseases given?

A: The DTaP vaccine is given as an injection (shot) in the thigh muscle for infants. Older children will get the injection in the upper arm. The Tdap vaccine is given as an injection in the upper arm for children 7 years and older.

Q: Who should get it?

A: The Centers for Disease Control (CDC) recommends that children and preteens should get the vaccine. A booster is also recommended as an adult.

Q: When should they get it?

A: Children should receive a 5-part dose of DTaP at ages 2, 4 & 6 months. Also, a booster at 15-18 months and 4-6 years. They should receive a Tdap dose around 11-12 years.



**CONNECT WITH A COUNTY OF SAN DIEGO
PUBLIC HEALTH NURSE FOR MORE INFORMATION**

**CALL: 1 (866) 358-2966 OPTION 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV**



Diphtheria, Tetanus, & Pertussis

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS



Q: What is the difference between the DTaP vaccine and the Tdap vaccine?

A: The DTaP vaccine is only for children under 7 years old. The Tdap vaccine is for preteens and adults.

Q: What are common side effects when younger children receive the DTaP vaccine?

A: Soreness or swelling where the shot was given, fever, irritability, feeling tired, loss of appetite, and/or vomiting. Most side effects can last from 1 to 3 days.

Q: What are the common side effects when preteens receive the Tdap vaccine?

A: Pain, redness, or swelling where the shot was given, mild fever, headache, feeling tired, nausea, vomiting, diarrhea, and/or stomachache. Most side effects can last from 1 to 3 days.

Q: Who should not receive these vaccines?

A: Children who had a serious allergic reaction to a previous dose of DTaP or Tdap vaccine should talk to their pediatrician.

To learn more, please visit sdiz.org:



**CONNECT WITH A COUNTY OF SAN DIEGO
PUBLIC HEALTH NURSE FOR MORE INFORMATION**

**CALL: 1 (866) 358-2966 OPTION 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV**



Difteria, Tétanos, y Pertusis

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES



P: ¿Qué es?

R: La difteria, el tétanos y la pertusis (tos ferina) pueden ser enfermedades bacterianas graves. Estas enfermedades se pueden prevenir de manera segura en niños con las vacunas DTaP y Tdap.

P: ¿Un niño que ya tuvo tos ferina puede volver a contraerla?

R: Contagiarse dos veces de tos ferina es poco común, pero puede ocurrir. Puede parecer una tos que no desaparece en lugar de una enfermedad grave.

P: ¿Cómo se administran las vacunas que previenen estas enfermedades?

R: La vacuna DTaP se administra como una inyección en el músculo del muslo, para bebés. Los niños mayores recibirán la inyección en la parte superior del brazo. La vacuna Tdap se administra como una inyección en la parte superior del brazo para niños de 7 años o más.

P: ¿Quiénes deberían vacunarse?

R: Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan que los niños y los preadolescentes se vacunen. También se recomienda un refuerzo como adulto.

P: ¿Cuándo deberían vacunarse?

R: Los niños deben recibir la dosis de la vacuna DTaP en 5 partes, a los 2, 4 y 6 meses de edad. Además, un refuerzo a los 15-18 meses y a los 4-6 años. Deben recibir también una dosis de Tdap alrededor de los 11-12 años.



CONÉCTESE CON UNA ENFERMERA DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN DIEGO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

**LLAME AL: 1 (866) 358-2966 OPCIÓN 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV**



Difteria, Tétanos, y Pertusis

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES



P: ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna DTaP y la vacuna Tdap?

R: La vacuna DTaP es solo para niños menores de 7 años. La vacuna Tdap es para preadolescentes y adultos.

P: ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes cuando los niños pequeños reciben el Vacuna DTaP?

R: Dolor o hinchazón donde se aplicó la inyección, fiebre, irritabilidad, sensación de cansancio, pérdida del apetito y/o vómitos. La mayoría de los efectos secundarios pueden durar de 1 a 3 días.

P: ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes cuando los preadolescentes reciben la vacuna Tdap?

R: Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre leve, dolor de cabeza, sensación de cansancio, náuseas, vómitos, diarrea y/o dolor de estómago. La mayoría de los efectos secundarios pueden durar de 1 a 3 días.

P: ¿Quiénes no debe recibir estas vacunas?

R: Los niños que tuvieron una reacción alérgica grave a una dosis anterior de la vacuna DTaP o Tdap, deben hablar con su pediatra.

Para obtener más información visite: sdiz.org:



ESCANEA
AQUÍ



CONÉCTESE CON UNA ENFERMERA DEL SERVICIO
DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN DIEGO
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

LLAME AL: 1 (866) 358-2966 OPCIÓN 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV

