

# Difteria, Tétanos, y Pertusis

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES



**P: ¿Qué es?**

**R:** La difteria, el tétanos y la pertusis (tos ferina) pueden ser enfermedades bacterianas graves. Estas enfermedades se pueden prevenir de manera segura en niños con las vacunas DTaP y Tdap.

**P: ¿Un niño que ya tuvo tos ferina puede volver a contraerla?**

**R:** Contagiarse dos veces de tos ferina es poco común, pero puede ocurrir. Puede parecer una tos que no desaparece en lugar de una enfermedad grave.

**P: ¿Cómo se administran las vacunas que previenen estas enfermedades?**

**R:** La vacuna DTaP se administra como una inyección en el músculo del muslo, para bebés. Los niños mayores recibirán la inyección en la parte superior del brazo. La vacuna Tdap se administra como una inyección en la parte superior del brazo para niños de 7 años o más.

**P: ¿Quiénes deberían vacunarse?**

**R:** Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan que los niños y los preadolescentes se vacunen. También se recomienda un refuerzo como adulto.

**P: ¿Cuándo deberían vacunarse?**

**R:** Los niños deben recibir la dosis de la vacuna DTaP en 5 partes, a los 2, 4 y 6 meses de edad. Además, un refuerzo a los 15-18 meses y a los 4-6 años. Deben recibir también una dosis de Tdap alrededor de los 11-12 años.



**CONÉCTESE CON UNA ENFERMERA DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN DIEGO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**

**LLAME AL: 1 (866) 358-2966 OPCIÓN 5  
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV**



# Difteria, Tétanos, y Pertusis

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES



**P: ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna DTaP y la vacuna Tdap?**

**R:** La vacuna DTaP es solo para niños menores de 7 años. La vacuna Tdap es para preadolescentes y adultos.

**P: ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes cuando los niños pequeños reciben el Vacuna DTaP?**

**R:** Dolor o hinchazón donde se aplicó la inyección, fiebre, irritabilidad, sensación de cansancio, pérdida del apetito y/o vómitos. La mayoría de los efectos secundarios pueden durar de 1 a 3 días.

**P: ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes cuando los preadolescentes reciben la vacuna Tdap?**

**R:** Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre leve, dolor de cabeza, sensación de cansancio, náuseas, vómitos, diarrea y/o dolor de estómago. La mayoría de los efectos secundarios pueden durar de 1 a 3 días.

**P: ¿Quiénes no debe recibir estas vacunas?**

**R:** Los niños que tuvieron una reacción alérgica grave a una dosis anterior de la vacuna DTaP o Tdap, deben hablar con su pediatra.

Para obtener más información visite: [sdiz.org](https://sdiz.org):



ESCANEA  
AQUÍ



CONÉCTESE CON UNA ENFERMERA DEL SERVICIO  
DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN DIEGO  
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

LLAME AL: 1 (866) 358-2966 OPCIÓN 5  
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV

