

TAKING CARE OF YOUR ARM AFTER THE TUBERCULOSIS SKIN TEST (TST).

TAKING CARE OF YOUR ARM AFTER THE TUBERCULOSIS SKIN TEST (TST).

01 What can I do with my arm?

Anything you would do regularly.

02 How do I clean my arm?

You can take showers and baths as you normally do.



03 What do i do if my arm itches or blisters?

Put an ice cube in a washcloth and place it on your arm.
Do not scratch!



04 Can I use a band-aid if it bleeds?

No. Band-aids increase allergies. Use a dry cotton ball to dab away any blood.



You must return within 48-72 hours to have your arm looked at or you will have to repeat the skin test.



01 What can I do with my arm?

Anything you would do regularly.

02 How do I clean my arm?

You can take showers and baths as you normally do.



03 What do i do if my arm itches or blisters?

Put an ice cube in a washcloth and place it on your arm.
Do not scratch!



04 Can I use a band-aid if it bleeds?

No. Band-aids increase allergies. Use a dry cotton ball to dab away any blood.



You must return within 48-72 hours to have your arm looked at or you will have to repeat the skin test.



EL CUIDADO DEL BRAZO DESPUÉS DE LA PRUEBA DE TUBERCULINA EN LA PIEL.

EL CUIDADO DEL BRAZO DESPUÉS DE LA PRUEBA DE TUBERCULINA EN LA PIEL.

01 ¿Qué puedo hacer con mi brazo?

Todo que haría normalmente.

02 ¿Cómo me limpio el brazo?

Puede bañarse como lo hace normalmente.



03 ¿Qué hago si me da comezón o aparecen ampollas en el brazo?

Ponga un cubito de hielo en una toallita o en un pañuelo y póngaselo en el brazo. **¡No se rasque!**



04 ¿Puedo usar una curita si hay sangrado?

No. Los “curitas” aumentan las alergias. Use un trocito de algodón seco para limpiar la sangre.



Deberá regresar a esta clínica en un plazo de 48 a 72 horas para la lectura de la prueba o será necesario repetirla.

01 ¿Qué puedo hacer con mi brazo?

Todo que haría normalmente.

02 ¿Cómo me limpio el brazo?

Puede bañarse como lo hace normalmente.



03 ¿Qué hago si me da comezón o aparecen ampollas en el brazo?

Ponga un cubito de hielo en una toallita o en un pañuelo y póngaselo en el brazo. **¡No se rasque!**



04 ¿Puedo usar una curita si hay sangrado?

No. Los “curitas” aumentan las alergias. Use un trocito de algodón seco para limpiar la sangre.



Deberá regresar a esta clínica en un plazo de 48 a 72 horas para la lectura de la prueba o será necesario repetirla.

